


Management of Stable Coronary Artery Disease



Cath lab ประเมิน

- ประวัติ VT , VF , Heart failure FC II ให้นัด CAG
- CCS III , IV ให้นัด CAG
- CCS I,II ส่ง EST
- Dobutamine Stress echo. (short protocol)
- ไม่ได้ทำ Stress test

หมายเหตุ DTS = Duke treadmill score

สรุป Case นี้

- นัด CAG±PCI วันที่.....
 - นัด EST วันที่.....
 - นัด Dobutamine Stress echo. วันที่.....
 - Medication F/U แพทย์.....วันที่OPD.....
- ผู้ประเมิน/ แพทย์.....

Non-invasive วันที่.....

ผล EST ; Duke treadmill score =

- if EST positive DTS < 5 ให้ นัด CAG
- EST positive DTS ≥ 5 ให้ Medication
- if EST negative ให้ Medication

ผล Dobutamine stress echo (short protocol)

- positive พบ Wall motion abnormality > 2 segment ที่ low dose Dobutamine (< 10 µg/kg/min) หรือที่ RR < 120 bpm. ให้นัด CAG
- negative ให้ Medication

- สรุป นัด CAG วันที่.....
- Medication F/U แพทย์.....วันที่OPD.....

ผู้ประเมิน/ แพทย์.....

หมายเหตุ

อาการปวดเค้นอกที่แบ่งตาม Canadian cardiac Society (CCS)

Class I อาการปวดเค้นอกเกิดเฉพาะเมื่อออกกำลังกายหนักๆหรือออกกำลังกายเป็นเวลานาน

Class II อาการปวดเค้นอกเกิดเมื่อออกกำลังกายปานกลาง เช่น เดินขึ้นบันไดได้มากกว่า 1 ชั้น ด้วยความเร็วปกติ หรือเกิดขณะมีความเครียดทางอารมณ์

Class III อาการปวดเค้นอกเกิดแม้เพียงทำกิจวัตรประจำวันที่เบาๆเช่น เดินขึ้นบันไดได้เพียง 1 ชั้นเท่านั้นหรือเดินได้ระยะทางน้อยกว่า 100 เมตร

Class IV อาการปวดเค้นอกเกิดขึ้นแม้ขณะพัก ไม่สามารถทำกิจกรรมเล็กน้อยได้